

## FOGLIO ILLUSTRATIVO

### GAVISCON 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale GAVISCON 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta Sodio alginato + sodio bicarbonato

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

#### **Contenuto di questo foglio**

1. Che cos'è Gaviscon e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon
3. Come prendere Gaviscon
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Gaviscon
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. CHE COS'È GAVISCON E A COSA SERVE**

Gaviscon è un medicinale che appartiene alla classe dei farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo.

Gaviscon si usa per il trattamento sintomatico del bruciore dello stomaco occasionale.

#### **2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE GAVISCON**

##### **Non usi Gaviscon**

Se è allergico al sodio alginato o al sodio bicarbonato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6), compresi metile paraidrossibenzoato (E218) e propile paraidrossibenzoato (E216) (parabeni).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Non usi il medicinale per trattamenti protratti. Se i sintomi persistono dopo 7 giorni, consulti il medico. Negli adolescenti (12-18 anni) usare solo in caso di effettiva necessità e sotto stretto controllo del medico.

In caso di insufficienza renale, il medicinale deve essere utilizzato con precauzione poiché il supplemento salino esogeno fornito dagli antiacidi può condizionare squilibri elettrolitici potenzialmente severi.

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

##### **Altri medicinali e Gaviscon**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

E' consigliabile interporre un intervallo di almeno due ore tra l'assunzione di Gaviscon e quella di altri farmaci, specialmente tetracicline, fluorochinoloni, sali di ferro, ormoni tiroidei, cloroquina, bifosfonati ed estramustina.

##### **Gravidanza e allattamento**

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

In gravidanza e allattamento Gaviscon può essere usato dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio. Consultare il medico nel caso si sospetti uno stato di gravidanza o si desideri pianificare una maternità.

##### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Gaviscon non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

##### **Gaviscon contiene sodio, calcio carbonato, metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato**

###### **Sodio**

Questo medicinale contiene 6.2 mmol (o 141 mg) di sodio per 10 ml di sospensione. Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

###### **Calcio carbonato**

Ogni dose da 10 ml di sospensione contiene 1.6 mmol (o 160 mg) di calcio carbonato.

Si deve prestare attenzione nel trattare pazienti affetti da ipercalcemia, nefrocalcolosi e calcoli renali ricidivi contenenti calcio.

#### **Metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato**

La sospensione contiene metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato che possono provocare reazioni allergiche (anche ritardate).

### **3. COME PRENDERE GAVISCON**

#### **Quanto**

##### **Adulti e adolescenti (12-18 anni):**

10-20 ml (seconda-quarta tacca del misurino o 2-4 cucchiaini dosatore o 1- 2 bustine monodose) dopo i pasti e al momento di coricarsi.

Attenzione: non superare le dosi indicate.

#### *Popolazioni speciali*

**Anziani:** non è necessario modificare le dosi per questa fascia d'età.

**Pazienti con insufficienza renale:** la ridotta capacità di eliminare con l'urina il supplemento salino esogeno fornito dagli antiacidi può condizionare squilibri elettrolitici potenzialmente severi (vedere Avvertenze e precauzioni).

#### **Quando e per quanto tempo**

Usi Gaviscon solo per brevi periodi di trattamento.

Consulti il medico se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo sette giorni di trattamento, se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

#### **Come**

Per somministrazione orale. Agitare la sospensione prima dell'uso.

#### **Se prende più Gaviscon di quanto deve**

Una possibile conseguenza del sovradosaggio è la distensione addominale: in tal caso ricorrere al trattamento sintomatico adottando misure di supporto generiche.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Gaviscon avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

#### **Se dimentica di prendere Gaviscon**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

#### **Se interrompe il trattamento con Gaviscon**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Molto raro: (possono interessare fino a 1 persona su 10000)

reazioni anafilattiche o anafilattoidi  
reazioni di ipersensibilità, come orticaria  
sintomi respiratori come broncospasmo  
flatulenza, nausea  
edema

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

#### **Segnalazione di effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. COME CONSERVARE GAVISCON**

#### **TENERE QUESTO MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

#### **Norme di conservazione**

*Sospensione orale e sospensione orale aroma menta in flacone*

Conservare nella confezione originale. Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Non refrigerare.

*Sospensione orale aroma menta in bustine*

Conservare nella confezione originale. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non refrigerare.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.

Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

## **6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI**

### **Cosa contiene Gaviscon**

*Gaviscon 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale*

- i principi attivi in 10 ml sono: sodio alginato 500 mg, sodio bicarbonato 267 mg

- gli altri componenti sono: carbomeri, **calcio carbonato**, **metile paraidrossibenzoato (E218)**, **propile paraidrossibenzoato (E216)**, **sodio idrossido** (vedere paragrafo 2 "Gaviscon contiene sodio, calcio carbonato, metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato"), saccarina sodica, aroma finocchio, eritrosina, acqua depurata.

*Gaviscon 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta*

- i principi attivi in 10 ml sono: sodio alginato 500 mg, sodio bicarbonato 267 mg

- gli altri componenti sono: carbomeri, **calcio carbonato**, **metile paraidrossibenzoato (E218)**, **propile paraidrossibenzoato (E216)**, **sodio idrossido** (vedere paragrafo 2 "Gaviscon contiene sodio, calcio carbonato, metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato"), saccarina sodica, aroma menta, acqua depurata.

### **Descrizione dell'aspetto di Gaviscon e contenuto della confezione**

*Sospensione orale*

Flacone da 200 ml di sospensione orale. Alla confezione è annesso un misurino dosatore in polipropilene naturale con tacche da 5, 10, 15 e 20 ml, oppure un cucchiaino dosatore (polistirene trasparente) da 5 ml.

*Sospensione orale aroma menta*

- Flacone da 200 ml, 300 ml e 500 ml di sospensione orale.

- Bustine monodose da 10 ml di sospensione orale. Le confezioni contengono 12, 20 o 24 bustine.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

## **TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, East Yorkshire, (Regno Unito)

Rappresentante per l'Italia:

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., via G. Spadolini 7, 20141 Milano

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato l'ultima volta il**

**GAVISCON 250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta**  
**GAVISCON 250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto fragola**  
**Sodio alginato + sodio bicarbonato**

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale poiché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

**Contenuto di questo foglio**

1. Che cos'è Gaviscon e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon
3. Come prendere Gaviscon
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Gaviscon
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. CHE COS'E' GAVISCON E A COSA SERVE**

Gaviscon è un medicinale che appartiene alla classe dei farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo.

Gaviscon si usa per il trattamento sintomatico del bruciore dello stomaco occasionale.

**2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE GAVISCON**

**Non usi Gaviscon**

Se è allergico al sodio alginato o al sodio bicarbonato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

**Avvertenze e precauzioni**

Non usi il medicinale per trattamenti protratti. Se i sintomi persistono dopo 7 giorni, consulti il medico.

Negli adolescenti (12-18 anni) usare solo in caso di effettiva necessità e sotto stretto controllo del medico.

In caso di insufficienza renale, il medicinale deve essere utilizzato con precauzione poiché il supplemento salino esogeno fornito dagli antiacidi può condizionare squilibri elettrolitici potenzialmente severi.

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

**Altri medicinali e Gaviscon**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

E' consigliabile interporre un intervallo di almeno due ore tra l'assunzione di Gaviscon e quella di altri farmaci specialmente tetracicline, fluorochinoloni, sali di ferro, ormoni tiroidei, cloroquina, bifosfonati ed estramustina.

**Gravidanza e allattamento**

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

In gravidanza e allattamento Gaviscon può essere usato dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio. Consultare il medico nel caso si sospetti uno stato di gravidanza o si desideri pianificare una maternità.

**Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Gaviscon non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

**Gaviscon contiene sodio, calcio carbonato e aspartame**

**Sodio**

Questo medicinale contiene 2.65 mmol (o 61.5 mg) di sodio per compressa.

Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

**Calcio carbonato**

Ogni compressa contiene 80 mg (0,8 mmol) di calcio carbonato.

Si deve prestare attenzione nel trattare pazienti affetti da ipercalcemia, nefrocalcinosi e calcoli renali recidivi contenenti calcio.

#### **Aspartame**

Questo medicinale contiene una fonte di fenilalanina. Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria.

### **3. COME PRENDERE GAVISCON**

#### **Quanto**

*Adulti e adolescenti (12-18 anni):*

2-4 compresse dopo i pasti e al momento di coricarsi.

Attenzione: non superare le dosi indicate.

#### *Popolazioni speciali*

**Anziani:** non è necessario modificare le dosi per questa fascia d'età.

**Pazienti con insufficienza renale:** la ridotta capacità di eliminare con l'urina il supplemento salino esogeno fornito dagli antiacidi può condizionare squilibri elettrolitici potenzialmente severi (vedere Avvertenze e precauzioni).

#### **Quando e per quanto tempo**

Usi Gaviscon solo per brevi periodi di trattamento.

Consulti il medico se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo sette giorni di trattamento, se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

#### **Come**

Per somministrazione orale. Le compresse devono essere ben masticate (possono essere spezzate e masticate un po' alla volta). Successivamente si può bere un po' d'acqua.

#### **Se prende più Gaviscon di quanto deve**

Una possibile conseguenza del sovradosaggio è la distensione addominale: in tal caso ricorrere al trattamento sintomatico adottando misure di supporto generiche.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Gaviscon avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

#### **Se dimentica di prendere Gaviscon**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

#### **Se interrompe il trattamento con Gaviscon**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Molto raro (possono interessare fino a 1 persona su 10000):

reazioni anafilattiche o anafilattoidi  
reazioni di ipersensibilità come orticaria  
sintomi respiratori come broncospasmo  
flatulenza, nausea  
edema

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

#### **Segnalazione di effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. COME CONSERVARE GAVISCON**

#### **TENERE GAVISCON FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

#### **Norme di conservazione**

*GAVISCON 250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta:* conservare nella confezione originale; non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

*GAVISCON 250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto fragola*: conservare nella confezione originale; non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

*Compresse masticabili gusto fragola in contenitore con tappo a scatto*: dopo la prima apertura del contenitore il medicinale deve essere consumato entro 6 mesi; trascorso tale periodo il medicinale residuo deve essere eliminato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

## **6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI**

### **Cosa contiene Gaviscon**

*GAVISCON 250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta*

- I principi attivi sono: sodio alginato 250 mg, sodio bicarbonato 133,5 mg  
- gli altri componenti sono: mannitolo (E421), magnesio stearato, copovidone, acesulfame potassico, macrogol 20.000, aroma menta, **calcio carbonato, aspartame (E951)** (vedere paragrafo 2 "Gaviscon contiene sodio, calcio carbonato e aspartame").

*GAVISCON 250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto fragola*

- I principi attivi sono: sodio alginato 250 mg, sodio bicarbonato 133,5 mg  
- gli altri componenti sono: xylitolo, mannitolo (E421), macrogol 20.000, aroma fragola, magnesio stearato, ferro ossido rosso (E172) **calcio carbonato, aspartame (E951)** (vedere paragrafo 2 "Gaviscon contiene sodio, calcio carbonato e aspartame").

### **Descrizione dell'aspetto di Gaviscon e contenuto della confezione**

*Compresse masticabili gusto menta*: compresse dal sapore di menta, confezionate in blister. Il contenuto della confezione è di 16, 24, 32 o 48 compresse.

*Compresse masticabili gusto fragola*: compresse dal sapore di fragola, confezionate in contenitore per compresse o in blister. Il contenuto della confezione è di:

- contenitore per compresse: 16 e 20 compresse;
- blister: 16, 24, 32 e 48 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### **TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, East Yorkshire, (Regno Unito)

#### **Rappresentante per l'Italia:**

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., via G. Spadolini 7, 20141 Milano

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato l'ultima volta il**

**GAVISCON 500 mg + 267 mg compresse masticabili gusto menta**  
**Sodio alginato + sodio bicarbonato**

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale poiché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

**Contenuto di questo foglio**

1. Che cos'è Gaviscon e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon
3. Come prendere Gaviscon
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Gaviscon
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. CHE COS'È GAVISCON E A COSA SERVE**

Gaviscon è un medicinale che appartiene alla classe dei farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo.

Gaviscon si usa per il trattamento sintomatico del bruciore dello stomaco occasionale.

**2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE GAVISCON**

**Non usi Gaviscon**

Se è allergico al sodio alginato o al sodio bicarbonato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

**Avvertenze e precauzioni**

Non usi il medicinale per trattamenti protratti. Se i sintomi persistono dopo 7 giorni, consulti il medico. Negli adolescenti (12-18 anni) usare solo in caso di effettiva necessità e sotto stretto controllo del medico.

In caso di insufficienza renale, il medicinale deve essere utilizzato con precauzione poiché il supplemento salino esogeno fornito dagli antiacidi può condizionare squilibri elettrolitici potenzialmente severi.

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

**Altri medicinali e Gaviscon**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

E' consigliabile interporre un intervallo di almeno due ore tra l'assunzione di Gaviscon e quella di altri farmaci specialmente tetracicline, fluorochinoloni, sali di ferro, ormoni tiroidei, cloroquina, bifosfonati ed estramustina.

**Gravidanza e allattamento**

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

In gravidanza e allattamento Gaviscon può essere usato dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio. Consultare il medico nel caso si sospetti uno stato di gravidanza o si desideri pianificare una maternità.

**Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Gaviscon non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari

**Gaviscon contiene sodio, calcio carbonato e aspartame**

**Sodio**

Questo medicinale contiene 5.3 mmol (o 123 mg) di sodio per compressa.

Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

### **Calcio carbonato**

Ogni compressa contiene 160 mg (1.6 mmol) di calcio carbonato.

Si deve prestare attenzione nel trattare pazienti affetti da ipercalcemia, nefrocalcinosi e calcoli renali recidivi contenenti calcio.

### **Aspartame**

Questo medicinale contiene una fonte di fenilalanina. Può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria.

## **3. COME PRENDERE GAVISCON**

### **Quanto**

*Adulti e adolescenti (12-18 anni):*

1-2 compresse dopo i pasti e al momento di coricarsi.

Attenzione: non superare le dosi indicate.

### *Popolazioni speciali*

**Anziani:** non è necessario modificare le dosi per questa fascia d'età.

**Pazienti con insufficienza renale:** la ridotta capacità di eliminare con l'urina il supplemento salino esogeno fornito dagli antiacidi può condizionare squilibri elettrolitici potenzialmente severi (vedere Avvertenze e precauzioni).

### **Quando e per quanto tempo**

Usi Gaviscon solo per brevi periodi di trattamento.

Consulti il medico se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo sette giorni di trattamento, se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

### **Come**

Per somministrazione orale. Le compresse devono essere ben masticate (possono essere spezzate e masticate un po' alla volta). Successivamente si può bere un po' d'acqua.

### **Se prende più Gaviscon di quanto deve**

Una possibile conseguenza del sovradosaggio è la distensione addominale: in tal caso ricorrere al trattamento sintomatico adottando misure di supporto generiche.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Gaviscon avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

### **Se dimentica di prendere Gaviscon**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

### **Se interrompe il trattamento con Gaviscon**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Molto raro (possono interessare fino a 1 persona su 10000):

reazioni anafilattiche o anafilattoidi  
reazioni di ipersensibilità come orticaria  
sintomi respiratori come broncospasmo  
flatulenza, nausea  
edema

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

### **Segnalazione di effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. COME CONSERVARE GAVISCON**

### **TENERE GAVISCON FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

Conservare nella confezione originale; non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

## **6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI**

### **Cosa contiene Gaviscon**

- I principi attivi sono: sodio alginato 500 mg, sodio bicarbonato 267 mg  
- gli altri componenti sono: mannitolo (E421), magnesio stearato, copovidone, acesulfame potassico, macrogol 20.000, aroma menta, **calcio carbonato, aspartame (E951)** (vedere paragrafo 2 "Gaviscon contiene sodio, calcio carbonato e aspartame").

### **Descrizione dell'aspetto di Gaviscon e contenuto della confezione**

*Compresse masticabili gusto menta*: compresse dal sapore di menta, confezionate in blister. Il contenuto della confezione è di 24, 36, 40 o 48 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### **TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, East Yorkshire, (Regno Unito)

### **Rappresentante per l'Italia:**

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., via G. Spadolini 7, 20141 Milano

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato l'ultima volta il**

**GAVISCON 500 mg + 267 mg polvere orale**  
**Sodio alginato + sodio bicarbonato**

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

**Contenuto di questo foglio**

1. Che cos'è Gaviscon e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon
3. Come prendere Gaviscon
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Gaviscon
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

**1. CHE COS'E' GAVISCON E A COSA SERVE**

Gaviscon è un medicinale che appartiene alla classe dei farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo.

Gaviscon si usa per il trattamento sintomatico del bruciore dello stomaco occasionale.

**2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE GAVISCON****Non usi Gaviscon**

Se è allergico al sodio alginato o al sodio bicarbonato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

**Avvertenze e precauzioni**

Non usi il medicinale per trattamenti protratti. Se i sintomi persistono dopo 7 giorni, consulti il medico. Negli adolescenti (12-18 anni) usare solo in caso di effettiva necessità e sotto stretto controllo del medico.

In caso di insufficienza renale, il medicinale deve essere utilizzato con precauzione poiché il supplemento salino esogeno fornito dagli antiacidi può condizionare squilibri elettrolitici potenzialmente severi.

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.

**Altri medicinali e Gaviscon**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale compresi quelli senza prescrizione medica.

E' consigliabile interporre un intervallo di almeno due ore tra l'assunzione di Gaviscon e quella di altri farmaci, specialmente tetracicline, fluorochinoloni, sali di ferro, ormoni tiroidei, cloroquina, bifosfonati ed estramustina.

**Gravidanza e allattamento**

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

In gravidanza e allattamento Gaviscon può essere usato dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio. Consultare il medico nel caso si sospetti uno stato di gravidanza o si desideri pianificare una maternità.

**Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Gaviscon non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

**Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Gaviscon****Gaviscon contiene sodio, calcio carbonato, aspartame****Sodio**

Ogni bustina monodose di polvere orale contiene 123 mg (5,3 mmol) di sodio. Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

### **Calcio carbonato**

Ogni bustina monodose di polvere orale contiene 160 mg (1,6 mmol) di calcio carbonato. Si deve prestare attenzione nel trattare pazienti affetti da ipercalcemia, nefrocalcinosi e calcoli renali ricidivi contenenti calcio.

### **Aspartame**

Questo medicinale contiene aspartame, una fonte di fenilalanina: può esserle dannoso se è affetto da fenilchetonuria.

### **3. COME PRENDERE GAVISCON**

#### **Quanto**

*Adulti e adolescenti (12-18 anni):*

1-2 bustine monodose dopo i pasti e al momento di coricarsi.

*Attenzione: non superare le dosi indicate.*

#### *Popolazioni speciali*

**Anziani:** non è necessario modificare le dosi per questa fascia d'età.

**Pazienti con insufficienza renale:** la ridotta capacità di eliminare con l'urina il supplemento salino esogeno fornito dagli antiacidi può condizionare squilibri elettrolitici potenzialmente severi (vedere Avvertenze e precauzioni).

#### **Quando e per quanto tempo**

Usi Gaviscon solo per brevi periodi di trattamento.

Consulti il medico se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo 7 giorni di trattamento, se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

#### **Come**

Per somministrazione orale senza acqua. Versare il contenuto della bustina direttamente sulla lingua.

#### **Se prende più Gaviscon di quanto deve**

Una possibile conseguenza del sovradosaggio è la distensione addominale: in tal caso ricorrere al trattamento sintomatico adottando misure di supporto generiche.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Gaviscon avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

#### **Se dimentica di prendere Gaviscon**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

#### **Se interrompe il trattamento con Gaviscon**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Molto raro: (possono interessare fino a 1 persona su 10000)

reazioni anafilattiche o anafilattoidi  
reazioni di ipersensibilità, come orticaria  
sintomi respiratori come broncospasmo  
flatulenza, nausea  
edema

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

#### **Segnalazione di effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. COME CONSERVARE GAVISCON**

#### **TENERE QUESTO MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scadenza".

#### **Norme di conservazione**

Conservare nella confezione originale. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.. Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.

Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

## **6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI**

### **Cosa contiene Gaviscon**

#### **Cosa contiene Gaviscon**

Una bustina monodose di polvere orale contiene:

Principi attivi: sodio alginato 500 mg

sodio bicarbonato 267 mg

Gli altri componenti sono: calcio carbonato, silicone diossido, acido citrico anidro granulare, aroma menta, aspartame (E951), macrogol 20000, macrogol 400, aroma frutto della passione, acesulfame potassico (E950), xilitolo.

### **Descrizione dell'aspetto di Gaviscon e contenuto della confezione**

Gaviscon 500mg + 267 mg polvere orale è disponibile in bustine contenenti una polvere di colore crema.

Gaviscon 500mg + 267 mg polvere orale è fornito in bustine monodose confezionate in astuccio di cartone o blister con supporto in cartone

Le confezioni contengono 12, 24 o 32 bustine monodose .

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

### **TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E PRODUTTORE**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, East Yorkshire, (Regno Unito)

### **Rappresentante per l'Italia:**

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., via G. Spadolini 7, 20141 Milano

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato l'ultima volta il**